

دراسة طوبوغرافية نسيجية مقارنة لجلد الأبقار المحلية

مؤيد حسن عبد الرحيم، نيزك صبحي احمد وعبد السلام متى الياس

فرع التشريح، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق

(الاستلام ٢٥ آذار ٢٠٠٧؛ القبول ٧ تشرين الأول ٢٠٠٧)

الخلاصة

أخذت ستة قطع دائرية معلومة القطر من كل منطقة من المناطق التي استخدمت لدراسة جلد الأبقار المحلية. شملت الدراسة منطقه منتصف الجبهة، منطقة الظهر الأمامي، منطقة البطن أمام السرة، منطقة كيس الصفن ومنطقة الذيل قرب الجزء. ثبتت ثلاثة عينات من كل منطقة بمثبت الفورمالين المتعادل بينما ثبتت الثلاث الأخرى من كل منطقة بمحلول البوين الكحولي. أظهرت جميع النماذج انكماشا بالمساحة السطحية خاصة بعد عملية الطمر بالبارافين. كانت نسبة الانكمash النهاية واضحة بالعينات المثبتة بالبوين الكحولي مقارنة بالعينات المثبتة بالفورمالين المتعادل واستنادا على ذلك فقد بلغ العامل المصحح للعينات للعينات المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل ٠,٨١٠، لمنطقة الذيل و ٠,٧٨٧، لمنطقة كيس الصفن و ٠,٧٨٠، لمنطقة الجبهة و ٠,٧٨٠، لمنطقة الظهر و ٠,٧٦٦، لمنطقة البطن بينما بلغ العامل المصحح للعينات المثبتة بالبوين الكحولي ٠,٧٩٩، لمنطقة الذيل و ٠,٧٧٧، لمنطقة كيس الصفن و ٠,٧٦٩، لمنطقة الجبهة و ٠,٧٦٨، لمنطقة الظهر و ٠,٧٥٣، لمنطقة البطن. وبتطبيق العوامل المصححة المنوه عنها أعلاه فإن الكثافة الشعرية الحقيقية هي كما يلي: - ١٨,٤٨ ملم² في منطقة الذيل و ١٤,٠٧ ملم² لمنطقة كيس الصفن و ١١,٧٢ ملم² لمنطقة الجبهة و ١٠,٧٢ ملم² لمنطقة الظهر و ٩,١٦ ملم² لمنطقة البطن.

Comparative topographical histologic study of the skin of native cattle

M. H. Abdul-Raheem, N. S. Ahmed and A. M. Elias

Department of Anatomy, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract

Six circular samples of a known diameter were taken from each of the different regions of the skin of the native cattle. Three samples of each region were fixed in neutral buffered formalin whereas, the other three samples were fixed in alcoholic boin's fluid. All samples showed shrinkage in the surface area particularly after paraffin infiltration and embedding. The final shrinkage percentage were noticed to be relatively higher in sample fixed in boin's fluid than those fixed in neutral buffered formalin . Accordingly, the correction factors for samples fixed in boin's fluid were calculated to be 0.810 for tail region, 0.787 for scrotal region, 0.783 for frontal region 0.780 for back region and 0.766 for abdominal region, whereas the correcting factors of samples fixed in boin's solution were found to be 0.799 for tail region, 0.777 for scrotal region, 0.769 for frontal region, 0.768 for back region and 0.753 for the abdominal region. With the application of the above mentioned correcting factors the actual hair density at living condition were adjusted to be 18.48/mm² for tail region, 14.07/mm² for scrotal region, 11.72/mm² for frontal region, 10.72/mm² for back region and 9.16/ mm² for abdominal region.

Available online at <http://www.vetmedmosul.org/ijvs>

المقدمة

micrometer وتحديد قيمة المقياس المجهرى حسب العدسة الشيئية المستخدمة ثم مقارنة النتائج مع جهاز visopan . تم تحديد العامل المصحح وفق المعادلة $a_2/a_1 = (7)$ حيث تمثل a_1 المساحة السطحية للمقطع المصبوغ والمثبت على الشريحة و a_2 المساحة الأصلية لعينة الجلد الطازج.

النتائج

أظهرت النتائج وجود انكماش ملحوظ للعينات كافة بعد التثبيت وخاصة في منطقة البطن ثم منطقة الظهر وتنتها منطقة الجبهة ثم كيس الصفن ثم منطقة الذيل التي سجلت أقل نسبة انكماش وخاصة عند تثبيت العينات بمحلول الفورمالين المتعادل بينما كانت نسبة الانكمash في جميع العينات أعلى قليلاً عند استخدام البوين الكحولي ، إن نسبة الانكمash كانت ترتيبية لكافة العينات بعد الانكماش والترويق، في حين أظهرت النتائج وجود نسبة انكمash عالية في منطقة البطن بينما لوحظت أقل نسبة انكمash في منطقة الذيل (جدول ١٦) في جميع المناطق وباستخدام المثبتين المختلفين. ازدادت المساحة السطحية لكافة العينات بعد عملية الصبغ ولجميع المناطق مقارنة بالمساحة السطحية لنفس العينات بعد عملية الصبغ بالبارافين.

كانت الكثافة الشعرية للعينات المعاملة بمحلول الفورمالين المتعادل كالآتي $22,82 \text{ ملم}^3 / 17,88 \text{ ملم}^3$ ، $14,97 \text{ ملم}^3 / 13,75 \text{ ملم}^3$ ، $11,92 \text{ ملم}^3 / 13,75 \text{ ملم}^3$ لمناطق الذيل وكيس الصفن والجبهة والظهر والبطن على التوالي. بينما بلغت الكثافة الشعرية للعينات المثبتة في محلول البوين الكحولي $23,13 \text{ ملم}^3 / 18,11 \text{ ملم}^3$ ، $15,25 \text{ ملم}^3 / 14,02 \text{ ملم}^3$ ، $12,17 \text{ ملم}^3 / 11,92 \text{ ملم}^3$ لمناطق الذيل وكيس الصفن والجبهة والظهر والبطن على التوالي. وتوضح الأشكال ١، ٢، ٣ التباين في الكثافة الشعرية باختلاف مناطق الجسم. تم احتساب العامل المصحح للكثافة الشعرية وفق المعادلة المذكورة في المواد وطرق العمل للوصول للكثافة الشعرية الحقيقة، حيث وجّد أن العامل المصحح للعينات المثبتة في محلول الفورمالين المتعادل هو $0,810$ ، لمنطقة الذيل، $0,787$ ، لمنطقة كيس الصفن ، $0,873$ ، لمنطقة الجبهة، $0,780$ ، لمنطقة الظهر ، $0,766$ ، لمنطقة البطن، بينما بلغ العامل المصحح للعينات المثبتة بمحلول البوين الكحولي $0,799$ ، لمنطقة الذيل ، $0,777$ ، لمنطقة كيس الصفن، $0,769$ ، لمنطقة الجبهة، $0,768$ ، لمنطقة الظهر ، $0,753$ ، لمنطقة الظهر . واستناداً إلى العوامل المصححة فقد كانت الكثافة الشعرية الحقيقة لمناطق المدروسة من جد الأبقار هي $18,48 \text{ ملم}^3 / 14,07 \text{ ملم}^3$ في منطقة الذيل، $11,72 \text{ ملم}^3 / 10,72 \text{ ملم}^3$ في منطقة الجبهة، $9,16 \text{ ملم}^3 / 10,72 \text{ ملم}^3$ في منطقة الظهر.

تتأثر الأنسجة المحضرة بطريقة الطرmer بالبارافين بالمواد الكيميائية والتي تشمل المثبتات والكحول والمرورقات وشمع البارافين ودرجة حرارة فرن البارافين مما يؤدي إلى انكمash النسيج وبالتالي يقلل مساحته السطحية وبدرجات متزايدة (١)، ويؤدي هذا النقص بالمساحة السطحية إلى زيادة غير حقيقة للكثافة الشعرية مقارنة بجدل الحيوان الحي.

تم احتساب الكثافة الشعرية لمناطق مختلفة في جد الأبقار المحلية بتوسيع جربيات الشعر في مساحة سطحية محددة في المقاطع الأفقيّة المأخوذة من النماذج المحضرة عادة بطريقة الأساجع بالبارافين والمصبوغة بملون الهيماتوكسيلين ايوزين (٢،١). ولغرض احتساب الكثافة الشعرية الحقيقة لمناطق مختلفة من جد الأبقار المحلية لا بد من إيجاد العامل المصحح للكثافة الشعرية المحسوبة من الشرائح النسجية المصبوغة والمعاملة بطريقة الأساجع بالبارافين وهذا ما يهدف إليه البحث.

المواد وطرق العمل

استخدم لغرض الدراسة جد ستة أبقار محلية وحددت المناطق المراد دراستها بقلم ملون قبل الذبح، شملت الدراسة منطقة منتصف الجبهة ومنطقة الظهر الأمامي ومنطقة البطن أمام منطقة السره ومنطقة كيس الصفن ومنطقة الذيل قريباً من الجذر. اخذ من كل منطقة ستة نماذج وتم القطع بواسطة سطوانة دائيرية مجوفة وحادة الحافة وملوّنة القطر $9,8 \text{ ملم}$. وضعت ثلاثة نماذج من كل منطقة في مثبت الفورمالين المتعادل و الثلاثة نماذج الأخرى في مثبت البوين الكحولي (٣). تمت عملية الانكماش بالكحول الاثيلي والترويق بمادة زيت خشب الأرز cedar wood oil والطرmer بشمع البارافين (٤). قطعت النماذج أفقياً ابتداءً من البشرة لغاية مستوى افتتاح الغدد الدهنية على جربيات الشعر، ثم صبغت الشريحة المقطعة بطرفيّة ملون الهيماتوكليلين ايوزين (٦،٥). تم احتساب المساحة السطحية لكل قطعة باحتساب قطر النموذج بواسطة الورنية verniae وبعد قراءات وتطبيق القانون الخاص باحتساب مساحة الدائرة، أخذت المساحات السطحية لكل قطعة وبالطريقة أعلاه بعد عملية التثبيت وفي نهاية عملية الانكماش في الكحول وبعد الترويق بمادة زيت خشب الأرز وبعد التشريب بالبارافين و تقطيع النماذج وتنبيتها على الشريحة و اخيراً" بعد صبغ العينات.


تم احتساب الكثافة الشعرية في المليمتر المربع الواحد بوساطة احتساب عدد الجربيات لكل منطقة ضمن مساحة المجال المجهرى microscopic field المقاس مساحته السطحية بالاستعانة بالمقياس المجهرى لمنصة المجهر stage

الجدول ١ : الاختلاف في المساحة السطحية والنسبة المئوية للانكماش لنماذج الجلد المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل في المناطق المختلفة لجلد الأبقار المحلية والعامل المصحح للكثافة الشعرية.

المساحة السطحية للعينات ملم ^٣ (نسبة الانكمash)						المناطق المختلفة
	العامل المصحح	بعد القطع والصبغ	بعد الإسقاء بالبارافين	بعد الترويق	بعد الإنكار	بعد التثبيت
0.783	60.32 ± 6 (% 16.68)	58.23 ± 4 (% 18.07)	66.23 ± 12 (% 10.67)	70.97 ± 7 (% 6.03)	74.62 ± 11 (% 2.38)	الجبهة
0.780	60.12 ± 6 (% 16.88)	58.03 ± 25 (% 18.77)	66.33 ± 14 (% 10.36)	70.47 ± 13 (% 6.53)	74.34 ± 8 (% 2.66)	الظهر
0.766	59.00 ± 9 (% 18)	56.72 ± 13 (% 20.28)	65.97 ± 12 (% 11.03)	69.22 ± 11 (% 7.78)	73.41 ± 22 (% 3.59)	البطن
0.787	60.64 ± 3 (% 16.36)	58.54 ± 6 (% 18.46)	66.83 ± 3 (% 10.89)	70.66 ± 4 (% 6.34)	74.98 ± 6 (% 3.02)	كيس الصفن
0.810	62.44 ± 11 (% 14.56)	59.81 ± 12 (% 17.19)	67.8 ± 4 (% 9.2)	71.91 ± 11 (% 5.09)	75.46 ± 2 (% 1.54)	الذيل
المساحة السطحية للعينات قبل التثبيت = ٧٧ ملم ^٣						

الجدول ٢ : الاختلاف في المساحة السطحية والنسبة المئوية للانكماش لنماذج الجلد المثبتة بمحلول البوين الكحولي في المناطق المختلفة لجلد الأبقار المحلية والعامل المصحح للكثافة الشعرية

المساحة السطحية للعينات ملم ^٣ (نسبة الانكمash)						المناطق المختلفة
	العامل المصحح	بعد القطع والصبغ	بعد الإسقاء بالبارافين	بعد الترويق	بعد الإنكار	بعد التثبيت
0.769	59.23 ± 17 (% 17.77)	57.43 ± 13 (% 19.57)	65.85 ± 7 (% 11.15)	69.65 ± 11 (% 7.35)	73.62 ± 6 (% 3.39)	الجبهة
0.768	59.14 ± 11 (% 17.86)	57.22 ± 9 (% 19.78)	65.35 ± 8 (% 11.65)	69.12 ± 11 (% 7.88)	73.52 ± 3 (% 3.48)	الظهر
0.753	58.03 ± 7 (% 18.97)	55.32 ± 4 (% 21.68)	64.86 ± 3 (% 12.11)	68.73 ± 13 (% 8.27)	72.13 ± 8 (% 4.87)	البطن
0.777	59.89 ± 11 (% 17.11)	57.43 ± 7 (% 19.57)	65.67 ± 22 (% 11.33)	69.84 ± 11 (% 7.16)	73.66 ± 6 (% 4.13)	كيس الصفن
0.799	61.56 ± 23 (% 15.44)	58.47 ± 3 (% 18.53)	66.11 ± 4 (% 10.89)	70.75 ± 6 (% 6.25)	74.33 ± 15 (% 2.67)	الذيل
المساحة السطحية للعينات قبل التثبيت = ٧٧ ملم ^٣						




شكل(٣) صورة مجهرية ضوئية لقطع أفقي من جلد منطقة الذيل في مستوى الغدد الدهنية (←) لاحظ الزيادة الواضحة في أعداد جريبات الشعر مقارنة بالمناطق السابقتين. ملون H&E ٦٠ X.


المناقشة

تبين من خلال نتائج البحث أن نسبة الانكماش للعينات المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل أقل من نسبة الانكمash في العينات ذاتها المثبتة في محلول البوين الكحولي ولكافه المناطق المدروسة ولم يشر ستكمام وبريدنهايم (٧) في الأغنام المضربة إلى تأثير المثبتات المختلفة على نسبة الانكمash بينما أكد ذلك عبد الرحيم والهيثي (٥) في الأغنام والماعز المحلية وعبد الرحيم وجماعته (٦) في الأبقار ، وقد يعزى وجود تغير في نسبة الانكمash إلى وجود كحول بمحلول البوين الكحولي بنسبة ٧٠% مما يؤدي إلى انكمash اكبر بالأنسجة (٣،٤) .

أظهرت النتائج وجود انكمash إضافي في المساحة السطحية لجميع العينات المأخوذة من المناطق المختلفة بعد مرحلة الانكماز والترويق وحصل انكمash واضح بعد الطمر بالبارافين وهذا ما لاحظه (٥) في منطقة الظهر للأغنام والماعز المحلية و (٦) لمنطقة نفسها في جلد الأبقار المحلية ، إلا أن نسبة الانكمash كانت واضحة وبخاصة في منطقة البطن ومتقاربة في مناطق كيس الصفن والظهر والجهة بينما كانت أقل نسبة انكمash في منطقة الذيل وهذا ما أكدته أيضا (٥) في الأغنام والماعز المحلية و (٧) في الأغنام المضربة وقد يعود الانكمash الواضح بعد عملية الطمر بالبارافين إلى تأثير حرارة الفرن وتغلغل شمع البارافين (٤،٣) كما لوحظ ازدياد نسبة الانكمash في منطقة البطن مقارنة بالمناطق الأخرى وقد يعود



شكل(١) صورة مجهرية ضوئية لقطع أفقي من جلد منطقة البطن توضح جريبات الشعر في هذه المنطقة. ملون H&E ٦٠ X



شكل(٢) صورة مجهرية ضوئية لقطع أفقي من جلد منطقة كيس الصفن توضح ازدياد جريبات الشعر في هذه المنطقة. ملون H&E ٦٠ X

خلاليا متقرنة لا تتأثر كثيرا بعوامل الانكماش المختلفة لذلك فان زيادة الكثافة الشعرية تعني قلة نسبة الانكمash في تلك المنطقة من الجلد. تراوحت الكثافة الشعرية الحقيقية بين ٩,١٦ - ١٨,٤٨ ملم^٢ بينما أشار جنكسون (١٠) عند دراسته لجلد الأبقار إلى أن الكثافة الشعرية هي (٩,٩ ملم^٣) غير انه لم يشر إلى المنطقة. إن التباين في الكثافة الشعرية بين المناطق المختلفة قد أشار إليها عدد من الباحثين عند دراستهم لجلد الجمل ذو السنام الواحد (١١) والأغنام العواسية والماعز (٥) وفي جلد الأبقار المحلية (٦) وهذا يؤكد ضرورة تحديد المنطقة عند ذكر الكثافة الشعرية للحيوان المدروس. فذكر عبد الرحيم وجماعته (٦) أن الكثافة الشعرية في منطقة الظهر لجلد الأبقار المحلية هي (٩,٤٤ ملم^٤) بينما بلغت (١٠,٧٢ ملم^٥) لمنطقة نفسها في الدراسة الحالية ويعزى ذلك إلى الاختلاف في موقع اخذ العينات.

المصادر

1. Abdul Raheem MH, Al-Hety MS. Histological and morphological study of the skin of black goat. Iraqi J Vet Sci 1997; 10: 59-71.
2. Ryder M. Hair 1st ed. London: Edward Arnold, 1976: 11-14.
3. Lee G. Luna HT. Manual of histological staining methods of the armed forces institute of pathology. 3rd ed. New York:MC Graw-Hill Book company, 1960: 12-18.
4. Humason CH. Animal tissue techniques 3rd ed. Sanfrancisco: Wh Freeman & Company, 1972: 14-15.
5. Abdul Raheem MH. Al- Hety MS. The correction factor of hair density in the skin of Awasi sheep & Black goats. Iraqi J Vet Sci 2000; 13: 27-31.
6. Abdul Raheem MH, Elias AM, Ahmed NS. The correction factor of hair density in the skin of native cattle. Iraqi J of Vet Sci 2006;20(2): 177-182.
7. Steinhagen O, Bredn hann AEJ. The effect of histological processing on sheep sample . SAFR Animal Sci 1987; 17: 151-152.
8. Carter HB, Dolling. The hair follicle and apocrine gland population of cattle. Aust. J Agric Res 1954; 5: 745.
9. Carter HB, Clarke WH. The hair follicle and skin follicle population of Australian Merine sheep. Aust J Agri Res 1957; 8: 91.
10. Tenkinson DM and Nay T. The sweat glands and hair follicle of different species of Bovidae. Aust J of Biol Sci 1975; 28: 55-68.
11. Abdul Raheem MH, Al- Hety MS and Ahmed NS. Histological and morphological study of the skin of one humped camel (Camelus dromedaries) Iraqi J of Vet Sci 1999; 12.
12. Carter HB, Clarke WH. The hair follicale group & skin follicle population of Australian Merino sheep. Aust J Agric Res.1975; 8: 91

ذلك إلى كون نسيج الأدمة أقل كثافة من المناطق الأخرى مما انعكس على زيادة نسبة الانكمash بينما كانت نسبة الانكمash متقاربة في مناطق كيس الصفن والجهة والظهر حيث أن نسبة النسيج الأدمي في تلك المناطق أكثر كثافة بينما كان النسيج الأدمي في منطقة الذيل أشد كثافة مما انعكس على قلة نسبة الانكمash في تلك المنطقة .

لم يتطرق أحد من الباحثين إلى سبب ازدياد المساحة السطحية الواضح لكافة العينات وفي المناطق كافة بعد مرحلة التلوين وقد يعزى ذلك إلى إزالة ضغط البارافين المتصلب على أنسجة الجلد بعد عملية إذابة البارافين أو إلى تأثير المواد الكيميائية المستخدمة في التلوين . دلت النتائج إن نسبة الانكمash النهاية للعينات المستخدمة في محلول البوين الكحولي هي أكبر نسبيا مما هي عليه في محلول الفورمالين المتعادل ضمن المنطقة الواحدة، وانعكس ذلك على زيادة الكثافة الشعرية حيث كانت الكثافة الشعرية في التمادج المثبتة بمحلول البوين الكحولي هي الأعلى مما هي عليه في العينات المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل وللمناطق ذاتها مما يدل على وجود تناسب طردي بين ازدياد نسبة الانكمash وارتفاع الكثافة الشعرية لـ تلك المنطقة عند استخدام مثبتين مختلفين وهذا مطابق لما ذكره (٦) في جلد الأبقار المحلية وما أشار إليه كارتر و دولينيك (٨) في جلد الأبقار وعلى ذلك ولتصحيح الكثافة الشعرية يتوجب إيجاد العامل المصحح لكل منطقة من مناطق الجلد مع الأخذ بنظر الاعتبار المثبت المستعمل للوصول إلى الكثافة الشعرية الحقيقة لمنطقة معينة من جلد الحيوان الحي.

أشار الباحثان كارتر وكلارك (٩) إلى أن العامل المصحح للأغنام الماريناو كان بين ٠,٧٠-٠,٦ بينما ذكر ستنهانك و بریدنهايم (٧) إلى أن العامل المصحح للأغنام المضرية هو ٠,٧٩ بينما ذكر (٥) إلى أن العامل المصحح للأغنام المحلية هو بين ٠,٨٣-٠,٨٦، وفي الماعز المحلية هو ٠,٨١-٠,٧٨ وقد يعود ذلك الاختلاف في العوامل المصححة إلى اختلاف مناطق الجلد المدروسة وإلى الاختلاف بين أنواع الحيوانات المدروسة أو بين ضروب النوع الواحد من الحيوانات أو استخدام أنواع مختلفة من المثبتات.

إن نسبة الانكمash النهاية لمناطق الجسم المختلفة تتاسب تناوبا عكسيا مع الكثافة الشعرية لـ تلك المناطق ، بما أن "الجرييات الشعرية وجذور الشعر التي بداخلها تتالف أساسا" من