

## تأثير الرش بالمغذي العضوي Vit-org في نمو ومكونات حاصل البطاطا

بيان حمزه مجيد

قسم البستنة-كلية الزراعة – جامعة بغداد

## المستخلص

نفذت التجربة في حقول قسم البستنة /كلية الزراعة (ابو غريب) –جامعة بغداد لمعرفة مدى استجابة نبات البطاطا صنف ديزري للرش بتركيز مختلفة من المغذي العضوي Vit-org عند زراعتها في العروة الربيعية 2008 . يحتوي المغذي العضوي السائل المنتج من شركة GREEN HAS الايطالية على نتروجين عضوي ذائب في الماء 3% واوكسيد البوتاسيوم ذائب في الماء 6% وكاربون عضوي بايولوجي 18% ومادة عضوية 31%. رشت النباتات حتى البلل التام بعد عشرة ايام من البروغ الكلي بتركيز 0 و3 و4.5 و 6 مل/لتر ماء. قسمت النباتات الى ثلاث مجاميع اذ كررت عملية الرش مرتين بعد الرش الأولى وبفترة 15 يوماً بين رشاً وأخرى. تم استخدام تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بثلاثة مكررات. اظهرت النتائج تفوق الرش بالتركيز العالي من المغذي العضوي لثلاث مرات في طول النبات اذ بلغ 76.67 سم وعدد الاوراق 91.69 وعدد الافرع 6.33 وبمساحة ورقية 8921 سم<sup>2</sup> وبقياس كلوروفيل 50 وحدة SPAD وبوزن جاف 122.70 غم/نبات مقارنة بمعاملة القياس اذ بلغ طول النبات 47.0 سم وعدد الاوراق 49.0 وعدد الافرع 3.40 وبمساحة ورقية 5213 سم<sup>2</sup> وقياس كلوروفيل 41.60 وحدة SPAD ووزن جاف 63.25 غم/نبات، بالتتابع اما بالنسبة للحاصل ومكوناته فكان اتجاه النتائج يتوافق مع مسار نتائج صفات النمو الخضري اذ بلغت النسبة المئوية للمادة الجافة للدرنات 25.73% وبدرجة صلابة 11.40 كغم/سم<sup>2</sup> ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية 5.50 اما عدد الدرنات فكان 8.33 درنة/نبات وبمعدل وزن 123.58 غم/درنة وبمجموع حاصل 1.029 كغم/نبات، في حين بلغت المتوسطات لمعاملة القياس 19.92% و 10.56 كغم/سم<sup>2</sup> و 4.23 و 94.36 غم و 0.398 كغم لكل من النسبة المئوية للمادة الجافة للدرنات وصلابة الدرنات ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية وعدد الدرنات/نبات ومعدل وزن الدرنة ومجموع الحاصل للنبات الواحد ، بالتتابع. على ضوء ذلك نستنتج ان استعمال المغذي العضوي وسيلة ناجعة لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وللحفاظ على البيئة.

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences 41 (4): 1-7, 2010 Majeed.  
**EFFECT OF SPRAYING ORGANIC NUTRIENT (VIT-ORG) ON GROWTH AND YIELD OF POTATO**

Bayan H. Majeed

Dept. of Horticulture-College of Agriculture – University of Baghdad

## ABSTRACT

An experiment was conducted in the fields of the Department of Horticulture- College of Agriculture- University of Baghdad, to study the response of potato (*Solanum tuberosum* L.)cv. Desiree to the spraying of organic nutrient (Vit-org) at different concentrations, which is produced by GREEN HAS ITALIA Co. during spring season of 2008. The liquid organic nutrient contains [organic nitrogen (N) soluble in water (3% w/w), potassium oxide (K<sub>2</sub>O) soluble in water (6% w/w), organic carbon (C) from biological origin 18%, organic matter (31% w/w)]. Plants were sprayed until dripping, after ten days of emergence at concentrations of (0, 3, 4.5 and 6 ml/l H<sub>2</sub>O). The plants were divided into three groups and the process of spraying was repeated twice after the first spray, within (15) days interval. A randomized complete block design was used with three replicates. The results showed that plants sprayed with high concentration of organic nutrient for three times have significantly increased plant height to 76.67cm and number of leaves to 91.6, number of branches to 6.3 per plant, leaf area 8921 cm<sup>2</sup>, chlorophyll content to 50 SPAD unit, and plant dry weight to 122.70 g/plant, while the control treatment reached 47.0 cm plant height, 49.0 leaf, 3.40 branches, 5213 cm<sup>2</sup> leaf area, 41.60 SPAD unit, and plant dry weight 63.25 g/plant, respectively. The results of yield and its components were influenced in the same direction as the vegetative growth is done, dry weight percent of tubers was 25.73% , tubers firmness 11.40 kg/cm<sup>2</sup>, T.S.S was 5.50, and the number of tubers per plant was 8.33 with average weight 123.58 g, the yield per plant was 1.029kg while the control treatment gave means as 19.92% of dry weight percent of tubers, tubers firmness 10.56 kg/cm<sup>2</sup>, 4.23 T.S.S, 4.22 tuber, 94.36 g, 0.398 g , respectively. According to that we conclude that using organic nutrient will improve quality and quantity of production and conserve environment.

## المقدمة

## المواد وطرائق العمل

نفذت التجربة في جقول قسم البستنة - كلية الزراعة/ جامعة بغداد كتجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة للعروة الربيعية 2008 اذ زرعت تقاوي الصنف ديزري رتبة Elite المستوردة من قبل القطاع الخاص بتاريخ 2008/1/25 وعلى مروز وبمسافة 75 سم بين مرز و اخر وبمسافة زراعة 25 سم بين درنة و اخرى وشملت التجربة دراسة تاثير عاملين هما أربعة تراكيز من المغذي العضوي ورمز لها V (0 و 3 و 4.5 و 6 مل/لتر ماء)، اما العامل الثاني T فكان عدد الرشاش بالمغذي اذ رشت جميع النباتات والتي قسمت الى ثلاثة اجزاء وحتى البلل الكامل بعد 10 ايام من البزوغ الكلي للدرنات كرشة اولى والرشة الثانية شملت الجزء الثاني والثالث من النباتات بعد 15 يوماً من الرشة الاولى اما الرشة الثالثة فكانت ايضاً بعد 15 يوماً من الرشة الثانية والتي شملت الجزء الثالث من النباتات وبواقع ثلاثة مكررات ليصبح عدد الوحدات التجريبية الكلي 36 وحدة تجريبية ولم تستعمل اية مبيدات او اسمدة كيميائية سواء قبل الزراعة او بعدها. يحتوي المغذي العضوي Vit-org والمنتج من قبل شركة GREEN HAS ITALIA على (نتروجين عضوي ذائب في الماء =3% وزن/وزن ، اوكسيد البوتاسيوم ذائب في الماء =6% وزن/وزن ،كاربون عضوي من اصل بايولوجي 18% وزن/وزن ، مادة عضوية 31% وزن/وزن). وتم اختيار عشرة نباتات عشوائياً من كل وحدة تجريبية لدراسة قياسات طول النبات/سم وعدد الاوراق/نبات وعدد الافرع/نبات والمساحة الورقية /سم<sup>2</sup> بالطريقة الوزنية بعد 80 يوماً من الزراعة (15) والكلوروفيل في الاوراق بجهاز SPAD-502 وChlorophyll meter والمنتج من شركة Minolta اليابانية وبوحدة SPAD units (18)

تعد البطاطا *Solanum tuberosum* L. التي تعود للعائلة الباذنجانية Solanaceae من اهم محاصيل الخضر واكثرها استخداماً اذ انها تتصدر قائمة المحاصيل الدرنية (5) وتأتي بالمرتبة الرابعة كمحصول رئيسي بعد كل من الحنطة والذرة والرز (12) اذ يشكل الغذاء اليومي لاكثر من 75-90% من غذاء دول العالم (19). ونتيجةً للتطور الحضاري حصلت زيادة كبيرة في اعداد سكان العالم ومن ثم زيادة الطلب على الغذاء، لذا كان التوجه والاهتمام نحو زيادة المساحات المزروعة ورفع معدلات الانتاج للمحاصيل الزراعية ولا سيما محاصيل الخضر، مما ادى الى زيادة استعمال الازمدة والمبيدات الكيميائية المصنعة الذي بدوره ادى الى حصول ضرر في البيئة والصحة العامة للمجتمعات البشرية (8 و 20).

لذا لا بد من التوجه وبشكل جدي نحو اتباع طرق سليمة تضمن انتاج غذاء صحي وبنوعية جيدة فكان الاختيار في السنوات الاخيرة في استعمال المخصبات والمغذيات العضوية غير الضارة لتحسين خواص التربة وتغذية النبات والاسراع في النمو وزيادة الانتاج (6). وتعد طريقة التسميد الورقي ذات كفاءة وفعالية في تغذية النباتات وذلك لسرعة امتصاص العناصر الغذائية من قبل الاجزاء الخضرية ، فضلاً عن انها تجهز النبات بالمغذيات بصورة متجانسة (14).

على ضوء ما جاء آنفاً تهدف التجربة الى الحصول على نبات سليم بيئياً عن طريق دراسة مدى استجابة نبات البطاطا للرش بالمغذي العضوي Vit-org والذي يمتاز بتوفره ورخص ثمنه في الاسواق المحلية.

اما بالنسبة للحاصل ومكوناته فينتبين من الجدول 2 ان هناك تفوقاً معنوياً عند استعمال التركيز الاعلى من المغذي العضوي مقارنةً بالنباتات غير المعاملة فكانت النسبة المئوية للمادة الجافة للدرنات 24.98% مقارنةً بـ 19.92% وبدرجة صلابة 11.40 كغم/سم<sup>2</sup> مقارنةً بـ 10.56 كغم/سم<sup>2</sup> و 5.10 مقارنةً بـ 4.23 من T.S.S. بلغ عدد الدرنات للنبات الواحد 7.77 وبمعدل وزن 116.59 غم في حين اعطت نباتات المقارنة 4.22 وبمعدل وزن 94.36 غم، اما بالنسبة لحاصل النبات الواحد فكان 905.90 غم مقارنةً مع 398.20 غم لمعاملة القياس. لمعرفة تأثير عدد الرشاشات في الصفات المذكورة فان الجدول نفسه يشير الى تفوق النباتات التي رشت لثلاث مرات بالمغذي معنوياً عن النباتات الاخرى ، فكانت المتوسطات 23.75% و 11.02 كغم/سم<sup>2</sup> و 4.85 و 7.08 درنة و 110.24 غم و 780.50 غم ، بالتتابع يتضح ايضاً من الجدول نفسه ان تأثير التداخل كان معنوياً فقد اعطت النباتات التي رشت بالتركيز 6.0 مل/لتر من المغذي ولثلاث مرات افضل النتائج لصفات الحاصل المدروسة فكانت 25.73% و 11.40 كغم/سم<sup>2</sup> و 5.50 و 8.33 درنة و بوزن 123.58 غم وبالحاصل 1029.42 غم ، بالتتابع. على ضوء ما ورد آنفاً يتضح ان استعمال المغذي العضوي رشاً على الاوراق ادى الى تحسين صفات النمو الخضري والحاصل ومكوناته لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تدخل في عملية التمثيل الكربوني والتنفس وفي عملية البناء البروتوبلازمي اذ انها تدخل في تركيب الاحماض النووية DNA و RNA الضرورية لانقسام الخلايا ومن ثم الزيادة في ارتفاع النبات (4) ، وبين (1 و 8 و 9) ان الاسمدة العضوية تجهز النباتات بالعناصر المعدنية الضرورية ولاسيما النتروجين والبوتاسيوم والذي يعود لهما الفضل في زيادة قوة نشاط النمو الخضري والذي ينعكس بشكل ايجابي في زيادة

والنسبة المئوية للمادة الجافة للدرنات ودرجة الصلابة كغم/سم<sup>2</sup> بجهاز قياس الصلابة Pentrometer (7) و T.S.S بواسطة جهاز Hand Refractometer وعدد الدرنات/نبات ومعدل وزن الدرنة/غم واخيراً حاصل النبات الواحد/غم وتمت مقارنةً المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي L.S.D وعلى مستوى 0.05 (3).

### النتائج والمناقشة

تبين من جدول 1 وجود فروق معنوية في صفات النمو المدروسة بين التراكيز المستعملة من المغذي العضوي ومعاملة القياس لاسيما التركيز العالي 6 مل/لتر ، فقد بلغ متوسط طول النبات الى 71.56 سم وعدد الاوراق الى 81.85 ورقة/نبات وعدد افرع 5.52 لكل نبات مع مساحة ورقية 8652 سم<sup>2</sup> كما ارتفع محتوى الاوراق من الكلوروفيل ليصل 48.17 وحدة SPAD اضافة الى زيادة الوزن الجاف للنبات اذ بلغ 115.40 غم، فيما كانت القيم لنباتات المقارنة 46.0 سم و 46.78 ورقة/نبات و 3.37 فرع/نبات و 5213 سم<sup>2</sup> و 40.73 SPAD و 65.15 غم للصفات الأنفة الذكر ، بالتتابع. اما بالنسبة لتأثير عدد الرشاش بالمغذي العضوي فيشير الجدول الى تفوق النباتات والتي رشت لثلاث مرات معنوياً بالصفات الأنفة الذكر اذ بلغت المتوسطات 66.50 سم و 73.16 ورقة/نبات و 5.04 فرع/نبات و 7888 سم<sup>2</sup> و 45.60 وحدة SPAD و 103.53 غم ، بالتتابع. يوضح الجدول نفسه تأثير التداخل بين التراكيز للمغذي العضوي وعدد الرشاشات المستعملة اذ يتبين التفوق المعنوي في الصفات المدروسة عند استعمال التركيز الاعلى 6 مل/لتر ولثلاث مرات. اذ بلغ طول النبات 76.67 سم وبعده اوراق 91.69 وبعده افرع 6.33 للنبات الواحد وبمساحة ورقية 8921 سم<sup>2</sup> وبمحتوى كلوروفيل 50.0 وحدة SPAD للاوراق وبوزن جاف 122.70 غم للنبات.

النمو الخضري والذي ينعكس بشكل ايجابي في زيادة الحاصل للنبات، فالبيوتاسيوم يؤدي دوراً فعالاً في نقل المواد المصنعة في الاوراق الى اماكن خزنها في الدرنات (9) وان سبب الزيادة في المادة الجافة يعود الى علاقة الارتباط الموجبة والعالية بين الوزن الجاف للنبات وعدد الافرع والمساحة الورقية وطول النبات، (16 و 21). ان ما تم التوصل اليه من نتائج يتفق مع ما وجده عدد من الباحثين (1 و 2 و 13 و 15 و 17).

حاصل النبات ، كما ان توفر النتروجين يؤدي الى زيادة المساحة الورقية وبدوره يزيد من فعالية التمثيل الكربوني وتصنيع المواد الكربوهيدراتية كما يؤدي البوتاسيوم دوراً فعالاً في تحسين صفات النمو الخضري (9) ، وقد تعزى الزيادة في محتوى الكلوروفيل الى زيادة جاهزية عنصر النتروجين عن طريق رش المغذي العضوي ذي الاثر المهم في تكوين جزيئة الكلوروفيل (11).

ان تجهيز النباتات بالعناصر المعدنية الضرورية ولاسيما النتروجين تعمل على زيادة قوة ونشاط

**جدول 1. تأثير تراكيز وعدد رشات المغذي العضوي Vit-org والتداخل بينهما في النمو الخضري للبطاطا . صنف ديزري .**

الوزن الجاف غم/نبات	كلوروفيل وحدة SPAD	المساحة الورقية سم <sup>2</sup>	عدد الافرع/ نبات	عدد الاوراق/ نبات	طول النبات (سم)	التراكيز مل/لتر H <sub>2</sub> O	
65.15	40.73	5213	3.37	46.78	46.0	0 V <sub>0</sub>	
102.80	44.70	7567	4.70	65.93	63.8	3 V <sub>1</sub>	
107.91	46.03	8151	5.20	75.33	68.44	4.5 V <sub>2</sub>	
115.40	48.17	8652	5.52	81.85	71.56	6 V <sub>3</sub>	
0.909	0.717	0.933	0.05	0.51	1.52	L.S.D 0.05	
عدد الرشات							
89.02	44.12	6887	4.30	60.60	57.17	T <sub>1</sub> رشة واحدة	
100.90	45.0	7411	4.76	68.65	63.67	T <sub>2</sub> رشتين	
103.53	45.60	7888	5.04	73.16	66.50	T <sub>3</sub> ثلاث رشات	
0.787	0.621	0.808	0.04	0.44	1.31	L.S.D 0.05	
التداخل بين التراكيز وعدد الرشات							
63.25	41.60	5211	3.40	49.0	47.0	T <sub>1</sub>	V <sub>0</sub>
71.76	41.20	5317	3.67	51.67	48.0	T <sub>2</sub>	
60.43	39.40	5110	3.06	39.67	43.0	T <sub>3</sub>	
90.31	45.0	7181	4.35	56.41	55.0	T <sub>1</sub>	V <sub>1</sub>
107.23	44.30	7605	4.67	65.18	66.33	T <sub>2</sub>	
110.87	44.80	7914	5.10	76.20	70.0	T <sub>3</sub>	
92.79	43.40	7536	4.60	63.40	60.0	T <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>
110.80	46.50	8210	5.33	77.50	69.0	T <sub>2</sub>	
120.14	48.20	8707	5.67	85.10	76.33	T <sub>3</sub>	
109.72	46.50	7621	4.85	73.60	66.67	T <sub>1</sub>	V <sub>3</sub>
113.79	48.0	8514	5.40	80.28	71.33	T <sub>2</sub>	
122.70	50.0	8921	6.33	91.69	76.67	T <sub>3</sub>	
1.574	1.242	1.616	0.99	0.89	2.63	L.S.D 0.05	

جدول 2. تأثير تراكيز وعدد رشات المغذي العضوي Vit-org والتداخل بينهما في مكونات وحاصل البطاطا صنف ديزري .

التراكيز مل/لتر H <sub>2</sub> O	النسبة المئوية للمادة الجافة	الصلابة كغم/سم <sup>2</sup>	T.S.S	عدد الدرناات/ نبات	معدل وزن الدرنة غم	حاصل النبات الواحد غم
0 V <sub>0</sub>	19.92	10.56	4.23	4.22	94.36	398.20
3 V <sub>1</sub>	23.01	10.90	4.60	6.38	106.06	676.66
4.5 V <sub>2</sub>	24.30	11.26	4.83	7.44	110.62	823.01
6 V <sub>3</sub>	24.98	11.40	5.10	7.77	116.59	905.90
L.S.D 0.05	0.051	0.39	0.506	0.27	0.291	0.267
عدد الرشوات						
T <sub>1</sub> رشوة واحدة	21.89	11.00	4.47	5.70	103.19	588.18
T <sub>2</sub> رشوتين	23.56	11.07	4.75	6.58	107.30	706.03
T <sub>3</sub> ثلاث رشوات	23.75	11.02	4.85	7.08	110.24	780.50
L.S.D 0.05	0.044	0.34	0.438	0.24	0.252	0.232
التداخل بين التراكيز وعدد الرشوات						
T <sub>1</sub>	20.17	10.60	4.10	4.33	94.18	407.80
T <sub>2</sub>	20.43	10.90	4.50	4.33	98.10	424.77
T <sub>3</sub>	19.18	10.20	4.10	4.00	90.80	363.20
V <sub>0</sub>						
T <sub>1</sub>	20.95	10.80	4.50	5.47	101.30	554.11
T <sub>2</sub>	23.60	11.00	4.50	6.33	106.50	674.15
T <sub>3</sub>	24.50	10.90	4.80	7.33	110.40	809.23
V <sub>1</sub>						
T <sub>1</sub>	22.66	11.20	4.50	6.33	105.28	666.42
T <sub>2</sub>	24.80	11.00	5.00	7.33	110.40	809.23
T <sub>3</sub>	25.59	11.60	5.00	8.66	116.19	1006.20
V <sub>2</sub>						
T <sub>1</sub>	23.79	11.40	4.80	6.67	112.00	747.04
T <sub>2</sub>	25.43	11.40	5.00	8.33	114.20	951.29
T <sub>3</sub>	25.73	11.40	5.50	8.33	123.58	1029.42
V <sub>3</sub>						
L.S.D 0.05	0.089	0.69	0.876	0.48	0.505	0.463

## المصادر

L. رسالة ماجستير - قسم البستنة-كلية الزراعة -

جامعة بغداد. ع ص 88.

3.الساھوكي، مدحت مجيد وكريمة محمد وهيب.

1990. تطبيقات في تصميم وتحليل التجارب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار الحكمة

للطباعة والنشر. الموصل. ع ص 488.

4.الصحاف، فاضل حسين. 1989. تغذية النبات

التطبيقي.جامعة بغداد.مطبعة وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي. ع ص 260.

1.الدخولة، احلام عبد الرزاق محمد حسين. 2001.

تأثير التسميد بالبوتاسيوم والنترجين والفسفور

والشد المائي في مراحل نمو وانتاجية نبات

البطاطا.اطروحة دكتوراه.قسم علوم البستنة-كلية

الزراعة والغابات-جامعة الموصل. ع ص 145.

2.الزھاوي ، سمير محمد احمد.2007. تأثير

الاسمدة العضوية المختلفة وتغطية التربة في نمو

وانتاج ونوعية البطاطا *Solanum tuberosum*

12. Bowen, W.T. 2003. Water productivity and potato cultivation. in J.W. Kijhe, R. Barke, and D. Molden. Water productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement. CAB International. USA. P.229-238.
13. Bowen, W. ; H. Cabrea ; Barrera. ; V.G. Baigorria. 1997. Simulating the Response of Potato to applied nitrogen, CIP Program Report 381-386, J. Natural Resource Management in the Andes. USA.
14. Brayan, C. 1999. Foliar Fertilization. Secrets of Success. Proc. Symp "Bond Foliar application" 10-14 June. 1999. Adelaide. Australia. Publ. Adelaide Univ. p.30-36.
15. Gluska, A. 2000. Effect of agronomic practices on potato yield quality, Biul. IHAR 213, 173-178 (in polish).
16. Jablonska, A. 1990. Straw as an organic fertilizer in cultivation of vegetables. Part III. The effect of fertilization with straw on yield and dry matter content in fruits of vegetables. Biuletyn. Warzywniczy. 36:203-212.
17. Jefferies, R.A. and D.K. Mackerron. 1993. Response of potato genotypes to drought. II Leaf area index, growth and yield. Ann. Appl. Biol. 122(1):105-112.
18. Jemison, J. and M. Williams. 2006. Potato - Grain Study Project Report Water Quality Office. University of Maine, Cooperative Extension. <http://www.umext.main.edu>.
19. Santamaria, P., and A. Elia. 1997. Producing nitrate-free endive heads: Effect of nitrogen form on growth, yield and composition of endive: J. Amer. Soc. Hort. Sci. 122:140-145.
20. Stopes, C., S. Millington, and L. Woodward. 1996. The development of organic movement. Agriculture
5. حسن، احمد عبد المنعم. 1999. انتاج البطاطس. سلسلة محاصيل الخضر. الدار العربية للنشر والتوزيع. مصر. ع ص 446.
6. زيدان، رياض زيدان وسمير ديوب. 2005. تأثير بعض المواد الدبالية ومركبات الاحماض الامينية في نمو وانتاج البطاطا العادية ( *Solanum tuberosum* L. ) . مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. سلسلة العلوم البيولوجية. 27. (2): 91-100.
7. عبد الهادي ، عبد الإله مخلف وعدنان ناصر مطلوب ويوسف حنا يوسف. 1989. عناية وتخزين الفواكه والخضر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة بغداد. دار الحكمة للطباعة والنشر. العراق.
8. عثمان، جنان يوسف. 2007. دراسة تأثير استخدام الاسمدة العضوية في زراعة وانتاج البطاطا كمساهمة في الانتاج العضوي النظيف. رسالة ماجستير - كلية الزراعة - قسم البساتين - جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا. ع ص 110.
9. مطلوب، عدنان ناصر ومحمد طلال عبد السلام وسالم محمد بن سلمان. 2002. تأثير التسميد البوتاسي والرش بالبورون على النمو الخضري وكمية الحاصل ونوعية التقاوي في البطاطا صنف ديزري. مجلة اباء للابحاث الزراعية. 12(2): 15-29.
10. Abdelrazzaq, A. 2002. Effect of chicken manure, sheep manure and inorganic fertilizer on yield and nutrients uptake by onion. Pakistan Journal of Biological Science 5(3): 266-268.
11. Addiscott, T.M. 1974. Potassium and the distribution of calcium and magnesium in potato plants. J. Sci. Fd. 25:1173-1183.

22. Wein, H.C .1997. The Physiology of Vegetable Crops. Cornell University, CAB International , Ithaca, NY, USA, PP662.

Ecosystems and Environ.57(2-3):189-196.

21.Taha, M.K.Omara and EL-Jack.2003. Correlations among growth, yield and quality characters in *Cucumber melo* L. Czeck Cucurbit Genetic Cooperative Report.26:9-11.