

تأثير فيتامين هـ في سمية الكادميوم في اسماك الكارب الاعتيادي

شهباء خليل ابراهيم الطائي و آلاء حسين على الحمداني

فرع الأمراض، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق
e-mail: shahbaa_khalil@yahoo.com

(الاستلام ٢٥ شباط ٢٠٠٨؛ القبول ١٦ كانون الأول ٢٠٠٨)

الخلاصة

استخدم في هذه الدراسة كلوريد الكادميوم وبالتركيز دون المميت الوسطي والذي كان 1ملغم/لتر ولمدة 7 أيام مع فيتامين هـ بجرعة 0.2 ملغم/1غم من وزن الجسم ولمدة 3 أيام لقليل التأثيرات السمية للكlorيد الكادميوم. الا انه لم يكن هناك تحسن في المعايير الدموية والتي شملت قياس تركيز الهيموغلوبين وحجم خلايا الدم الحمر المرصوصة والنسبة المئوية لخلايا المفيفة، ولكن حدث انخفاض معنوي في نشاط كل من انزيمي الالبين امينوترايسفيريزو الكرياتين فوسفوكاينيز في مصل الدم. ولم تؤد المعاملة بفيتامين هـ مع كلوريد الكادميوم الى حدوث اصلاح في الانسجة المتضررة الناتجة عن التسمم بالكادميوم والتي تتضمن تغيرات مرورية عيائية كاحقان الغلاصم ونسجيا تمثلت الافات بحدوث فرط التنسج في الخلايا الظهارية وتضخم الخلايا الساندة المخاطية مع ارتشاح الخلايا الالتهابية مما ادى الى التصاق الصفائح الغلصمية الثانوية وقد لوحظ احتقان الكبد والكلية مع ظهور بقع شاحبة على السطح الخارجي لهما، ونسيجيا فقد تضمنت الافة ارتشاح الخلايا الالتهابية وخاصة الخلايا الميلانية البفعمية والخلايا وحيدة النواة في النسيج الكبدي، وتثنى جدار القنوات الصفراوية، وحدوث النزف والنخر في النسيج الكبدي بينما في الكلية فقد لوحظ احتقان الاوعية الدموية مع تكون القوالب المترجحة في النبيب الكلوية.

Effect of vitamin E on cadmium toxicity in common carp (*Cyprinus carpio L.*)

S. K. I. Al-Taee, A. H. A. Al-Hamdani

Department of Pathology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract

The sublethal median concentration of cadmium chloride was used at concentration 1mg/L for 7 days ,with 0.2mg/1g body weight of vitamin E for 3 days which was used as an antioxidant there was no improvement in hematological parameters, but there was significant reduction in the serum alanine aminotransferase and creatine phosphokinase activity. Treatment with vitamin E and cadmium chloride could not repair the tissues damage result from cadmium which included grossly congestion of gills , histopathological lesions revealed hyperplasia of epithelial cells with hypertrophy of piler cells and inflammatory cells infiltration which lead to adhesion of the secondary lamellae of gills, In liver and kidney which appeared congested with presence of pale areas, histopathological lesions include infiltration of inflammatory cells specially melanomacrophage and mononuclear cells in hepatic tissue with thickening of the bile duct wall, haemorrhage and necrosis in hepatic tissue, while in kidney there was congestion of blood vessels, deposition of hyaline casts in the renal tubule.

المقدمة

من الامراض مع استمرار التغذية إلى حين بدء التجربة اذ قطع الغذاء عنها قبل بدء التجربة بـ 24 ساعة.

جمع عينات الدم

جمعت عينات الدم من الوريد الذنبي للسمكة Caudal Vein قسم من العينات وضعت في انباب لاحتوبي على مانع التخثر لغرض الحصول على المصل والقسم الآخر من عينات الدم حفظ في انباب حاوية على مانع التخثر لغرض اجراء الفحوصات الدموية وبعد ذلك اجريت الصفة التشريحية للسمك المستخدمة في هذه الدراسة وسجلت التغيرات المرضية العيانية كما اخذت نماذج من انسجة كل من الغلاصم والكلية والكبد وحفظت في محلول الفورمالين الداري المت adulal لغرض اجراء الفحوصات النسجية.

استخدمت 20 سمكة قسمت عشوائيا الى 4 مجاميع وبواقع 5 اسماك لكل مجموعة.

المجموعة الاولى : مجموعة السيطرة اذ وضعت الاسمك في ماء خال من الكلور.

المجموعة الثانية: وضعت الاسمك في ماء خال من الكلور وحاوي على كلوريد الكادميوم بتركيز (1 ملغم/لتر) ولمدة 7 أيام.

المجموعة الثالثة: اعتبرت مجموعة سيطرة اذ جرعت الاسمك بفيتامين هـ وبجرعة 0.2 ملغم / 1 غ من وزن الجسم عن طريق الفم وبواسطة انبوب اللي المعدي (9) Stomach Tube (9) Stomach Tube ولمدة 3 أيام.

المجموعة الرابعة: وضعت الاسمك في ماء خال من الكلور وحاوي على كلوريد الكادميوم بتركيز (1 ملغم/لتر) وجرعت الاسمك بفيتامين هـ وبجرعة 0.2 ملغم / 1 غ من وزن الجسم عن طريق الفم وبواسطة انبوب اللي المعدي Stomach Tube (9) ولمدة 3 أيام وبنفس الوقت الذي عرضت فيه الاسمك للتسمم.

قتلت الاسمك في كل المجموعات بعد مرور 7 أيام ودرست التغيرات المرضية العيانية والنسيجية، المعايير الدموية والتي شملت: قياس تركيز الهيموغلوبين باستخدام عدة القياس الخاصة انتاج شركة Syrbio، فرنسا، تقيير حجم خلايا الدم الحمر المرصوصة باسخدام طريقة المايكروهيماتوكريت، والنسبة المئوية لخلايا اللمفية (10) المعايير الكيموحيوية والتي شملت: قياس نشاط انزيم الانزيم امينو ترانسفيريز انتاج شركة Biomaghreb، المغرب وقياس نشاط انزيم الكرياتين فوسفوکالبین انتاج شركة Biolabo SA، فرنسا.

بعد الكادميوم من العناصر المعدنية التي يؤدي التسمم بها الى احداث الكرب التاكسي (1) Oxidative stress اذ يحدث الكادميوم على انتاج اصناف الاوكسجين الفعال وذلك من خلال ارتباطه بموقع ارتباط المعادن الداخلية الفعالة كالنحاس والحديد مؤديا الى تحطم العضيات المهمة او نتيجة قلة كاسرات الجذور الداخلية مثل الكلوتاثيون (2) وتقي الخلايا نفسها من الجذور الحرة بواسطة انظمة مضادات الاكسدة (3) والتي قد تكون انزيمية مثل الكلوتاثيون بيروكسيديز او غير الانزيمية الازئية بالدهون(4)، طبيعيا يتكون من الفا - توکوفيرول، بيتا - توکوفيرول، دلتا - توکوفيرول و دلتا - توکوتريزنول، دلتا - توکوتريزنول (5). وبعد الفا - توکوفيرول اكثرها فعالية من الناحية البايولوجية اذ يعمل على التقليل من الاجهاد التاكسي الذي يحدث في عضويات الخلية Cell organells والنتائج عن اصناف الاوكسجين الفعالة (6)، كما يحافظ على استقرارية الغشاء الخلوي من خلال منعه لتكاثر الجذور الحرة (7)، كذلك يؤدي الى تكوين مركيبات الجذور غير المتأكسدة Non-radical oxidation من خلال التفاعل بين جذور الفا- توکوفيرول مع الجذور الحرة وهذه المركيبات لها القدرة على الاقتران مع حامض الكلوكوبورنيك Glucuronic acid والذى يطرح الى خارج الجسم مع البول او الصفراء(7). لفيتامين هـ اهمية في تحسين الاستجابة المناعية للسمك، اذ يعدل من التغييرات الفسلجية لاسماك القوس قزح عند تغذيتها على عائق ذات تراكيز عالية من الدهون الغير المشبعة (4)، اذ وجد (8) الى ان نقص فيتامين هـ في علية اسماك القوس قزح تؤدي الى ضعف النمو.

المواد وطرق العمل

الاسماك

استخدمت في هذه الدراسة اسماك الكارب الاعتيادي *Cyprinus carpio L.*، التي تم الحصول عليها من قسم الثروة الحيوانية- كلية الزراعة/جامعة دهوك وبواقع 20 سمكة، تراوحت اوزانها بين (100-50) غم ووضعت في احواض زجاجية قياسها (40×40×80) سم³ في ماء خال من الكلور Dechlorinated Water وكانت الدالة الحامضية pH 7.5 ودرجة حرارة 18-20 ° مع توفر الاوكسجين خلال مدة التجربة. تركت الاسمك لمدة اسبوع للتأقلم وللتتأكد من خلوها

حجم خلايا الدم الحمر المرصوقة %PCV

من الجدول (1) يتبيّن عدم وجود فروق معنوية بين معدلي المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم ولمدة 7 ايام والمجموعة الأخرى المعاملة بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ في حين انها انخفضت معنويًا ($P \leq 0.05$) عن المجموعة غير المعاملة بفيتامين هـ وكلوريد الكادميوم والتي بلغ معدلها 45.40% وعن المجموعة المعاملة بفيتامين هـ التي بلغ معدلها 40.80% ولم تختلفا معنويًا فيما بينهما.

النسبة المئوية للخلايا المفقمة

كما موضح في الجدول (1) ان المجموعة غير المعاملة بفيتامين هـ و كلوريد الكادميوم هي افضل المعدلات على مستوى نتائج هذه الصفة اذ بلغ معدلها 96.60% وقد بلغ معدل المجموعة المعاملة بفيتامين هـ 95.0% كما يوضح الجدول انخفاضاً معنوياً ($P \leq 0.05$) في معدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ ومعدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم ولمدة 7 ايام اذ بلغ معدليهما 85.40% و 80.40% على التوالي عن المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم وعن المجموعة المعاملة بفيتامين هـ.

المعايير الكيموحيوية

النهاية انتزاع الالئين امينو ترانسفيريز ALT في مصل الدم (وحدة دولية/لتر): من الجدول (2) يتبيّن وجود اختلافات معنوية بين المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم والمجموعة المعاملة بفيتامين هـ والمجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم لمدة 7 ايام والمجموعة الاخيرة والمعاملة بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ وكالاتي : بلغ معدل المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم والمجموعة المعاملة بفيتامين هـ 4.96 على التوالي في حين كان هناك ارتفاع معنوي ($P \leq 0.05$) في معدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم لمدة 7 ايام والذي بلغ 81.06 عن المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم وعن المجموعة المعاملة بفيتامين هـ، اما معدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ فقد بلغ 18.92 اذ انخفض معنويًا ($P \leq 0.05$) عن المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم ولمدة 7 ايام، الا ان معدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ كان مرتفعاً معنوياً ($P \leq 0.05$) عن المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم والمجموعة المعاملة بفيتامين هـ.

نشاط انزيم الكرياتين فوسفوكالبینز CPK في مصل الدم (وحدة دولية / لتر): اتضح من والجدول (2) اختلاف بين المجموعات المختلفة اذ بلغ معدل المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم

التحليل الاحصائي
تم استعمال اختبار تحليل التباين واختبار دنكن متعدد المديات
وباستعمال برنامج التحليل الاحصائي(11).

النتائج

التغيرات المرضية


أظهرت الأسماك المعاملة بكلوريد الكادميوم 1 ملغم/لتر مع فيتامين هـ 0.2 ملغم/1 غم من وزن الجسم سباحة طبيعية الى نهاية مدة التجربة والتي كانت 7 أيام. وعند اجراء الصفة التشريحية للأسماك المعاملة بفيتامين هـ مع كلوريد الكادميوم لوحظ نفس التغيرات المرضية العيانية التي لوحظت في المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم بالتركيز دون المميت الوسطي 1ملغم/لتر ولمدة 7 أيام من التعرض والتي تمثلت باحتقان الغلاصم وقد اظهرت نتائج الفحص النسيجي للغلاصم حدوث التغير الدهني في قسم من الخلايا الظهارية للصفائح الغلصمية الثانوية الصورة (1) مقارنة مع صورة (2) التابعة لمجموعة السيطرة وفي الكلية تمثل الافات العيانية بظهور البقع الخنزيرية والمحاطة بمناطق نزفية ونسجياً كانت الافات المرضية في الكلية عبارة عن ارتشاح الخلايا الالتهابية في النسيج الخلالي مع وجود نزف وحدوث التنسك الزجاجي *Hyaline degeneration* في بعض النبيبات الكلوية الصورة (3) مقارنة مع صورة (4) التابعة لمجموعة السيطرة وعند اجراء الفحص العياني للكبد لوحظ وجود الاحتقان مع ظهور البقع الخنزيرية المحاطة بمناطق نزفية الصورة ، وكانت الافات المرضية النسجية الملاحظة في النسيج الكبدي اقل شدة بالمقارنة مع الافات المرضية الملاحظة في الكبد بعد مرور 7 أيام من المعاملة بكلوريد الكادميوم متمثلة بنزف بسيط في النسيج الخلالي الكبدي وحدوث التنسك الفجوي الصورة (5) مقارنة مع كبد الأسماك لمجموعة السيطرة الصورة (6).

الهيموغلوبين
التغيرات الدموية

بينت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه التجربة ان تركيز الهيموغلوبين لم يتأثر عند استعمال فيتامين هـ اذ يوضح الجدول (1) ان تركيز الهيموغلوبين في المجموعة المعاملة بفيتامين هـ مع كلوريد الكادميوم وبعد مرور 7 ايام لم تختلف معنويا عن المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم بعد 7 ايام وعن المجموعة المعاملة بفيتامين هـ مع ملاحظة الفرق الحسابي الا ان معدل هاتين المجموعتين لتركيز الهيموغلوبين انخفض معنويا ($P \leq 0.05$) عن المجموعة غير المعاملة بفيتامين هـ وكلوريد الكادميوم.

بكلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ وبلغ 12.48 عن المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم ولمدة 7 أيام ومع هذا كان مرتفعاً ملحوظاً ($P \leq 0.05$) عن المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم وعن المجموعة المعاملة بفيتامين هـ.

والمجموعة المعاملة بفيتامين هـ على التوالي في حين بلغ معدل المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم لمدة 7 أيام 19.88 والذى ارتفع معنوفياً ($P \leq 0.05$) عن معدل المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم والمجموعة المعاملة بفيتامين هـ، فيما انخفض معنوفياً ($P \leq 0.05$) معدل المجموعة المعاملة



الصورة (1) صورة نسجية لمقطع في غلاصم سمكة معرضة لكlorيد الكادميوم بتركيز 1ملغم/لتر ولمدة 7 أيام مع فيتامين هـ /0.2 غ من وزن الجسم عن طريق الفم ولمدة 3 أيام، توضح التغيير الدهني (a) في قسم من الخلايا الظهارية المبطنة لقواعد الصفائح الغلصمية الثانية. X400، H&E.

الجدول (1) تأثير كلوريد الكادميوم مع فيتامين هـ على المعايير الدموية في الأسماك.


المجموعات	الهيemoغلوبين غرم/100 ملليلتر	حجم خلايا الدم الحمر المرصوصة %	عدد الخلايا اللمفية %
المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم	1.79 ± 14.64	3.34 ± 45.40	0.97 ± 96.60
	a	A	A
المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم 1ملغم/لتر لمدة 7 أيام	1.03 ± 8.46	0.48 ± 21.20	1.02 ± 80.40
	b	B	B
المجموعة المعاملة بفيتامين هـ 0.2 ملغم / 1 غ من وزن الجسم ولمدة 3 أيام	0.47 ± 11.22	2.22 ± 40.80	1.54 ± 95.00
	ab	A	A
المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم 1ملغم/لتر مع فيتامين هـ 0.2 ملغم/1 غ من وزن الجسم	0.91 ± 8.72	3.02 ± 27.20	3.61 ± 85.40
	b	B	B

-القيم تمثل المعدل ± الخطأ القياسي (5 أسماك لكل مجموعة).


-الحرروف المختلفة الموجودة على المعدلات تعنى وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية ($P \leq 0.05$).




الصورة (2) صورة نسجية لقطع في غلاصم سمكة غير معاملة بكلوريد الكادميوم التابعة لمجموعة السيطرة، الصبغة X400 .H&E



الصورة (3) صورة نسجية لقطع في كلية سمكة معرضة لكلوريد الكادميوم بتركيز املغم/لتر ولمدة ٧ ايام توضح ارتشاح الخلايا الالتهابية (a) وحدوث التكثز الزجاجي (b)، الصبغة H&E، X100.



الصورة (٤) صورة نسيجية لقطع في كلية سمكة غير معاملة بكلوريد الكادميوم التابعة لمجموعة السيطرة، الصبغة H&E ، X400 .



الصورة (٥) صورة نسيجية لقطع في كبد سمكة معرضة للكادميوم بتركيز ١ملغم/لتر ولمدة ٧ أيام توضح التكس الفجوي في النسيج الكبدي (a) وحدوث النزف (b) H&E ، X100 .



الصورة (6) صورة نسجية لقطع في كبد سمكة غير معاملة بكلوريد الكادميوم التابعة لمجموعة السيطرة، الصبغة H&E ، X400.

الجدول (2) تأثير فيتامين هـ مع كلوريد الكادميوم على المعايير الكيموحيوية في الأسماك.

المجموعات		انزيم الازين امين و تر انسفيري زوجة دولية/لتر دولية/لتر	انزيم الكرياتين فوسفو كاينيز وحدة
0.91±5.38 C	0.70±5.48 C	المجموعة غير المعاملة بكلوريد الكادميوم	
2.67±19.88 A	4.32±81.06 A	المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم 1ملغم/لتر لمدة 7 ايام	
0.48±5.28 C	0.77±4.96 C	المجموعة المعاملة بفيتامين هـ 0.2ملغم / 1 غم من وزن الجسم ولمدة 3 ايام	
2.92±12.48 B	4.02±18.92 B	المجموعة المعاملة بكلوريد الكادميوم 1ملغم/لتر مع فيتامين هـ 0.2ملغم / 1 غم من وزن الجسم	

- القيمة تمثل المعدل \pm الخطأ القياسي (5 اسماك لكل مجموعة).

-الحروف المختلفة الموجودة على المعدلات تعنى وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية ($P \leq 0.05$).

المناقشة

لنتائج الفحص العياني والنسيجي لغلاصم وكلية وكبد الاسماء المعاملة بكلوريد الكادميوم 1 ملغم/لتر ولمدة 7 ايام، مما يدل على ان جرعة فيتامين هـ 0.2 ملغم/غرام من وزن الجسم كانت قليلة ولم تكن ضمن المستوي المطلوب.

ان نتائج فحص المعايير الدموية والتي شملت قياس تركيز الهيموغلوبين وقياس حجم خلايا الدم الحمر المرصوصة ونسبة المئوية للخلايا اللمفية في المجموعة المعاملة بالتركيز دون المميت الوسطي لكلوريد الكالديميوم 1ملغم/لتر مع فيتامين هـ 0.2 ملغم/غم من وزن الجسم لم تظهر أي تحسن لهذه

ان الكادميوم هو احد الملوثات البيئية المائية الكفيلة بان تحدث الاجهاد التاكسدي من خلال زيادة مستوى ترثخ الدهن وقلة مستويات مضادات الاكسدة (12) لذا استخدم فيتامين هـ مضاداً للاكسدة (13) ومحاولة القليل من الاثر السمي للكادميوم، الا ان نتائج الفحص العياني والنسريجي لكل من الغلاظم والكلية والكبد لم تظهر اي اصلاح للانسجة المتضررة، اذ كانت الافات المرضية العيانية والنسريجية مشابهة

المصادر

- Srivastava S, Tripathi RD , Dwivedi UN.Synthesis of phytochelatenes and modulates of antioxidant in response to cadmium stress in *cuscuta reflexa*. J Plant Physiol. 2004;61(6):665-674.
- Stohs SJ, Bagchi D.Oxidative mechanism in the toxicity of metal ions Free-Rad.Biol Med.1995;18,321-336.
- Chandran R, Sivakumar AA , Mohandas S, Aruchami M.Effect of cadmium and zinc antioxidant enzyme activity in the gasteropod,Achtina fulica.Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2005;20(abstract).
- Puangkaew J, Kiron V, Satoh S, Watenabe T.Antioxidant defense of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in relation to dietary n-3 highly unsaturated fatty acids and vitamin E content. Comparative Biochemistry and Physiology. Part C. 2005;140 : 187 - 196.
- Sen CK, Khanna S, Roy S.Tocotrienols : Vitamin E beyond tocopherol. Life Sci. 2006; 78(18) : 2088 – 98.
- Ibrahimi WH, Blagavan HN, Chopra RK, Chow CK.Dietary coenzyme Q₁₀ AND vitamin E alter the status of these compounds in rat tissues and mitochondria. JNutr.2000; 130 : 2343 – 2349.
- Barbasic H. Vitamin E: action, metabolism and Perspectives. Physiol Biochem. 2001; 57(1):43-56.
- Frischknecht R, Wahli T, Meier, W. Comparison of Pathological changes due to deficiency of vitamine C and vitamine E and combination of vitamine C and E in rain bow trout *Oncorhynchus mykiss* (Wabom). S.Fish Dis. 1994;17 : 3 – 45.
- صالح، احمد ياسر.طفيليات الامعاء في اسماك الخشني في الموصل، دراسة الخمج التجاري بالاكريات نوع *Grouussia carpelli* في اسماك الكارب الاعتيادي وتأثير الميثابونين على الخمج. رسالة ماجستير.الموصل: جامعة الموصل، 2005 .
- Coles EH.Veterinary clinical pathology. 4th ed., W.B.Saunders Company Philadelphia, London , Toronto. 1986;PP.43 – 64.
- SAS, Institute.SAS Users Guide : statistics version. 12 edition SAS Institute INC Cary NC. 1997.
- Ferreira M,Moradas – ferreira P., Reis - Henriques MA.Oxidative Stress biomarker in two resident species, mullet (*Mugil cephalus*) and flounder (*Platichthys flesus*), from apolluted site in River Douro Estuary Portugal. Aquatic Toxicology.2005; 71 : 39 - 48.
- الحمداني،اء حسين علي. سمية الساپيرمثرين في اسماك الكارب الاعتيادي. اطروحة دكتوراة. الموصل: جامعة الموصل، 2006 .
- Ognjanović BI, Pavlović SZ, Maletić SD, Žikić RV, Štajni AŠ, Radojičić RM, Saičić ZS .Petrović VM. Protective Influence of Vitamin E on Antioxidant Defense System in the Blood of Ras Treated with Cadmium.Physiol Res. 2003;52:563-570.
- السلمان، نادر عبد العزاوي، علي حسين والرديني، عبد المطلب جاسم ورزوقي، رعد حاتم والتيمي، محمد طالب حسن وعباس، لؤي محمد. التأثيرات الغذائية لملح الطعام المستخدم في التغذية الملحية لاسماك الكارب الاعتيادي. مجلة ابحاث البصرة 1999 .، العدد 22، الجزء الثاني، 39-51 .

المجموعة مقارنة مع المجموعة المعاملة بالتركيز دون الميت الوسطي لكlorيد الكادميوم في حين ان اشار الباحث (14) الى ان الحقن العضلي للجرذان المعاملة بكlorيد الكادميوم بفيتامين هـ وبجرعة 20 وحدة دولية / كيلوغرام من وزن الجسم ادى الى حدوث تحسن في المعايير الدموية والتقليل من التأثير السمي للكادميوم، وهذا ما يؤكد ان العلقة التي كانت تعطى للأسماك كانت علقة غير موزونة مما ادى الى الاكسدة وتزنج الدهن والذى ينتج عنه تكوين جذور الاوكسجين الحرجة وبنفس الوقت لم يضاف اي من المواد المانعة للتزنج مثل فيتامين هـ لتفادي حدوث التزنج، وبالتالي فان الاصحاص الدهنية الغير مشبعة تكون عرضة للاكسدة بوجود جزء الاوكسجين والتي تعمل كائزيات مساعدة على الاكسدة الذاتية. ومن هذا يستدل على ان الجرعة المستخدمة من فيتامين هـ لم تستطع كسر جذور الاوكسجين الحرجة (15). اما بالنسبة للمعايير الكيموحيوية فقد لوحظ انخفاض في نشاط انزيم ALT وانزيم CPK للأسماك المعاملة بالتركيز دون الميت الوسطي 1 ملغم/لتزمع فيتامين هـ 0.2 ملغم / 1 غ من وزن الجسم عند مقارنتهما مع المجموعة المعاملة بكlorيد الكادميوم 1 ملغم/لتر ولمدة 7 ايام، وقد يعود ذلك الى ان فيتامين هـ هو من مضادات الاكسدة النوعية والتي لها دور في الحفاظ على توازن الخلايا من خلال منع تكوين جذور الاوكسجين الحرجة التي تنتج بسبب التسمم (13) وبهذا يقلل من سمية الكادميوم بان من الاجهاد التاكسدي ومن ثم التقليل من تركيز اكسدة الدهون وعند مقارنة نشاط هذين الانزيمين لهذه المجموعة مع المجموعة غير المعاملة بكlorيد الكادميوم وفيتامين هـ نلاحظ استمرار التأثير السمي للكادميوم وبقاء نشاط انزيم ALT ونشاط انزيم CPK عاليين عن الحد الطبيعي. وذلك لأن دور فيتامين هـ لم يكن ضمن المستوى المطلوب ويعود تفسيره الى ما ذكر افرا".

شكر وتقدير

تم دعم البحث من قبل كلية الطب البيطري، جامعة الموصل. البحث مستمد من رسالة الماجستير للباحثة الاولى.